




鉤端螺旋體病 20251022

鉤端螺旋體病是由鉤端螺旋體感染產生的感染症，是熱帶、亞熱帶地區常見的人畜共通感染病。

① 傳播方式

經由食入或接觸受感染動物之尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。當人們工作（農夫、衛生下水道工程人員或維修人員、礦工）、游泳、戲水或野營時，經由皮膚傷口、口咽黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口感染。



② 臨床症狀

感染者的臨床症狀多樣化，可能沒有症狀或產生各種從輕微到嚴重的症狀；輕微者症狀與感冒類似，包括發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉酸痛等，部分會以腦膜炎症狀表現，嚴重者會出現腎衰竭、黃疸、心肌炎或出血現象，甚至致命。

③ 治療

給予抗生素與積極的支持性治療，包括呼吸治療、體液的控制和電解液平衡、以及處理出血等，若出現腎衰竭，可給予透析治療。

④ 注意事項

- 避免接觸可能遭受污染的水或土壤
- 當工作必須暴露於病源環境時，採用適當的防護措施，例如長靴、手套和圍裙。
- 保持居家環境清潔，隔離被感染的動物，避免尿液污染環境。

參考資料 中國醫藥大學附設醫院網址

<https://www.cmu.edu.tw/HealthEdus?type>