



瘧疾預防性用藥須知 20251022

出國前服用瘧疾預防藥物，請盡量於出國前一個月，先向醫師諮詢，評估感染之風險、預防性投藥之需求與是否有服用上的禁忌症，目前國內瘧疾預防用藥計有下列 4 種：

藥品成分名	預防性投藥方式	禁忌症及注意事項
去氧羥四環素 Doxycycline	<ul style="list-style-type: none">每日一次 100 mg (1 錠)抵達高風險區前 1 ~ 2 日開始服用，離開高風險區後繼續服用 28 日。	<u>禁忌症</u> ：孕婦、8 歲以下兒童、哺乳中婦女、肝功能不全者。 <u>副作用</u> ：皮膚光敏感性（建議加強防曬）、胃痛。
羥氯奎寧 Hydroxy-chloroquine	<ul style="list-style-type: none">每週一次 400 mg (2 錠)抵達高風險區前 2 週開始服用，離開高風險區後繼續服用 4 週，多數地區有抗藥性。	<u>禁忌症</u> ：孕婦、視網膜斑病變、哺乳婦女、乾癬、蠶豆症、兒童。 <u>副作用</u> ：視力模糊、皮膚發疹、噁心、下痢。
阿托奎酮與氯胍混合製劑 (Malarone®)	<ul style="list-style-type: none">每日一次 1 錠 (atovaquone 250 / proquanil 100 mg)抵達高風險區前 1 ~ 2 日開始服用，離開高風險區後繼續服用 7 日。	<u>禁忌症</u> ：懷孕及哺乳中婦女、嚴重腎功能不全病人、40 公斤以下者。 <u>副作用</u> ：頭痛、噁心、嘔吐、胃痛、腹瀉、食慾不振。
美爾奎寧 Mefloquine	<ul style="list-style-type: none">每週一次 250 mg (1 錠)抵達高風險區前 1 ~ 2 週開始服用，離開高風險區後繼續服用 4 週。	<u>禁忌症</u> ：精神疾病病人、癲癇病史、心律不整、懷孕前 3 個月婦女。 <u>副作用</u> ：噁心、嘔吐、暈眩、頭痛、失眠。

參考資料 中國醫藥大學附設醫院網址

<https://www.cmuhs.cmu.edu.tw/HealthEdus?type>