

# 備勞喘定量噴霧液

## Berotec N metered aerosol

### (Fenoterol 100mcg/puff)



- **醫師為何開立此藥：**

備勞喘定量噴霧液為支氣管擴張劑，適用於急性氣喘與可逆性呼吸道狹窄等疾病。

其成分Fenoterol為選擇性 $\beta 2$ -腎上腺素受體促效劑，為阻塞性呼吸道疾病治療用藥，可有效治療支氣管痙攣。

- **什麼時候該使用此藥：**


1. 急性氣喘發作。
2. 伴隨有支氣管痙攣之可逆性呼吸道狹窄。
3. 預防運動引發的氣喘。

- **注意事項：**

1. 每天最多不得使用超過8個定劑量。
2. 若超過3天未使用，需對空按壓測試噴霧是否正常。
3. 容器為加壓器，不可強力打開或暴露於高溫下。
4. 含200個定劑量，藥罐不透明，務必記錄使用次數。



● 使用方法：

1. 使用前，應上下搖晃藥瓶，確保藥液充分混合。
2. 口含器對空按壓藥罐底部兩次，確認噴霧是否正常。
3. 移去口含器護蓋。
4. 臉朝外，深深地將空氣呼出。
5. 如右圖所示，食指與大拇指拿著吸入器，雙唇含著口含器。
6. 食指按壓藥罐底部，同時嘴巴深深吸氣。
7. 移除口含器，閉氣5~10秒，最後臉朝外呼氣。
8. 如需第二個定劑量，請重複步驟4~7，使用完畢請蓋回保護蓋。



● 清潔：

每週至少應清潔吸入器的口含器一次。  
吸入器的口含器務必保持清潔，以確保藥品不會堆積而阻塞噴霧劑。

|                                                                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>清潔吸入器的步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 先將防塵蓋取下，把藥罐從口含器移除。</li><li>2. 以溫水洗滌口含器，直到沒有藥物組塞和沒有可見的灰塵。</li></ol> |
|  | <p>清潔後，甩乾口含器並令其陰乾，勿使用任何加熱方式。<br/>當口含器乾燥後，將藥罐和防塵蓋組裝回原樣。</p>                                                                   |

杏永藥劑科藥物諮詢專線：(07) 724-8999轉分機5110