

英克賜易利達乾粉吸入劑

Incruse Ellipta inhalation powder

(Umeclidinium 55 mcg/dose , 30 doses/inhaler)



- **醫師為何開立此藥：**

英克賜易利達乾粉吸入劑是慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療用藥。

- **藥物作用：**

Umeclidinium 是一種長效型抗膽鹼藥物。

可抑制平滑肌上的 M3 受體，使支氣管擴張。

- **注意事項：**


1. Incruse Ellipta 不可用於緩解急性症狀。
2. Incruse Ellipta 不適用於兒童、孕婦、哺乳婦女。
3. 患有狹角性青光眼或尿滯留/攝護腺肥大的患者，使用 Incruse Ellipta 時應謹慎，如出現視覺模糊或排尿困難等症狀，應立即向醫師諮詢。
4. 嚴重乳蛋白過敏的病人不可使用 Incruse Ellipta。
5. 應長期每天固定時間以經口吸入方式投藥 1 次。
6. 每 24 小時不可使用 Incruse Ellipta 超過 1 次。

使用方法：



● 重要資訊：

- 吸入器含有 30 個劑量，每次打開吸口蓋，會聽到『卡嗒』聲，代表藥物準備好可供吸入使用，此時劑量計數器會減 1，表示已上好一劑藥物。
- 若把蓋子打開再關上，但又未吸入藥物，會浪費掉該劑藥物，浪費掉的藥物會被密封在吸入器內，無法再供使用，因此不會吸入兩倍或過量劑量。確保不浪費藥物：『要吸再開，還沒吸不要關』
- 切勿讓您的手指擋住通氣孔。
- 當吸入器小於 10 劑，劑量計數器左邊會呈現紅色，提醒您需準備新吸入器。在您使用最後一劑藥物後，劑量計數器顯示 0，表示吸入器已經空了。



杏永醫院藥物諮詢專線：(07) 724-8999 轉分機 5110