


用藥常見問題

Q：同時有在服用其他醫院、診所、或其他科別的藥物，可以一併服用嗎？


A：



如有上述情況，請在看診時主動告知您的醫師，並將所服用藥品、藥袋包裝一併帶給醫師看，並依照醫師指示服用。



若您正在服用的藥物或營養品無法確定是否有交互作用，建議先諮詢醫師或藥師。




如有任何疑問，請即聯絡診間醫師或藥物諮詢室。

用藥常見問題

Q：嬰幼兒服藥應注意那些事項？


A：



嬰幼兒盡量以滴管、餵藥器或藥杯分餵藥次，並以水平視線測量。



適時安撫、鼓勵，不要強制灌藥，以免藥物嗆入呼吸道或日後抗拒吃藥。



勿將藥物放入牛奶中，請配以白開水服用

服藥後出現嘔吐的處理：

服藥後出現嘔吐反應的時間	建議處置
立即吐出/服藥後30分鐘內大量嘔吐	加補餵一劑，若補服一次後再次嘔吐，則不再補服
服藥後30~60分鐘大量嘔吐	可加補服一半的藥量
服藥後超過2小時(120分鐘)大量嘔吐	不需再補服，待下次餵藥的時間到了服藥即可

用藥常見問題

Q：忘記用藥怎麼辦？

A：



大部分藥品若忘記服藥，應於想起時立即使用。



若已接近下一次服藥時間，只需使用下一次劑量，**「勿同時使用雙倍劑量」**。