

耐絞寧錠

NITROSTAT 0.6mg

(硝化甘油舌下錠Nitroglycerin)



- **醫師為何開立此藥：**
緩解及預防因冠心病引起之心絞痛急性發作。
- **什麼時候該使用此藥：**
緩解：有胸悶、胸痛、胸口有壓迫感時，請立即服用。
預防：運動/爬樓梯前5~10分鐘服用。
- **使用方法：**
步驟一：含在舌下，千萬不要把藥吞下去或咬碎。
步驟二：坐下休息，防止頭暈摔倒。
步驟三：原地休息等待5分鐘，觀察第一顆藥的反應。
步驟四：沒好立刻打119，15分鐘內最多含3顆。

胸悶 → 含1顆 $\xrightarrow[\text{仍未緩解}]{\text{等待5分鐘}}$ → 再含1顆 $\xrightarrow[\text{仍未緩解}]{\text{等待5分鐘}}$
→ 最後1顆 $\xrightarrow[\text{仍未緩解}]{\text{等待5分鐘}}$ → 打119

● 保存方式：

1. 耐絞寧錠容易受到溫度、濕度、光線影響藥效。
2. 應隨身攜帶放於隨身包中，但不要放在貼身衣物如胸前或褲子口袋中，也不要將藥品倒出棕色小罐子分裝。
3. 首次使用請在瓶身寫上開封日期並丟棄內附的棉花，開封後半年(6個月)，就算沒吃完也必須丟掉，請醫師重新開立耐絞寧錠。

● 藥物交互作用：

1. 禁止與壯陽藥物併用，避免導致致命性低血壓。

如果有在服用下列藥物，看診時請務必主動告知醫師。

PDE5抑制劑：威而鋼Viagra(Sildenafil)、犀利士Cialis (Tadalafil)、樂威壯Levitra(Vardenafil)

2. 避免飲酒，硝酸鹽與酒精併服時，可能引起低血壓。

杏永醫院藥物諮詢專線：(07) 724-8999轉分機5110