

用藥指導單張

學名：Insulin aspart

商品名：Novomix 30 FLEXPEN 300IU/3ML

中文名：諾和密斯 30 諾易筆 注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

糖尿病

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。

一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 劑量是按照個別情況與患者的需要而決定。建議進行血糖監控及調整胰島素劑量來達到理想的血糖控制。
2. 以皮下注射方式注射在大腿或腹壁，如果方便，也可注射在臀部和三角肌。相同部位的注射點必須輪替，以降低發生脂肪病變的風險。

三、使用時該注意的特別事項？

如同一般的胰島素治療，注射部位不良反應可能會發生，包括疼痛、變紅、瘀傷、腫脹及搔癢。同一部位的注射點不停地輪替可以減少或是預防這些不良反應。不良反應通常在數天到數星期內就會恢復。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：

在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物

五、此藥會造成什麼副作用？

低血糖。

六、此藥儲存時的條件為何？

未使用狀態下的儲存：

- 儲存於冰箱中(2°C至8°C)。不要太靠近冷凍庫。不可冷凍。
- 使用中或隨身攜帶備用時的儲存：
- 使用中或隨身攜帶備用時的本藥品不可存放於冰箱。在室溫下(低於30°C)儲存可達4星期。請將本注射劑的筆蓋蓋上以避光。本藥品應避免過熱及避光。

杏永醫院 藥劑科關心您