

潤娃易利達乾粉吸入劑

Relvar Ellipta inhalation powder

(Fluticasone/Vilanterol 92/22mcg/dose , 30 doses/inhaler)




- **醫師為何開立此藥：**
 1. 慢性阻塞性肺病(COPD)的維持治療。
 2. 18歲以上氣喘患者的治療。
- **藥物作用：**
 1. Fluticasone：吸入性皮質類固醇(ICS)-局部抗發炎
 2. Vilanterol：長效型 β_2 作用劑(LABA)-支氣管擴張劑
- **注意事項：**
 1. Relvar Ellipta 不適用於緩解急性支氣管痙攣。
 2. Relvar Ellipta 不適用於兒童及青少年
 3. 嚴重乳蛋白過敏的病人不可使用 Relvar Ellipta。
 4. 應長期每天固定時間以經口吸入方式投藥 1 次。
 5. 每 24 小時不可使用 Relvar Ellipta 超過 1 次。
 6. 吸入之後，患者應用水漱口，且不可吞下，這是為了幫助降低發生口咽念珠菌病的風險。

● 使用方法：



● 重要資訊：

- 吸入器含有 30 個劑量，每次打開吸口蓋，會聽到『卡嗒』聲，代表藥物準備好可供吸入使用，此時劑量計數器會減 1，表示已上好一劑藥物。
- 若把蓋子打開再關上，但又未吸入藥物，會浪費掉該劑藥物，浪費掉的藥物會被密封在吸入器內，無法再供使用，因此不會吸入兩倍或過量劑量。
確保不浪費藥物：『要吸再開，還沒吸不要關』
- 切勿讓您的手指擋住通氣孔。
- 當吸入器小於 10 劑，劑量計數器左邊會呈現紅色，提醒您需準備新吸入器。在您使用最後一劑藥物後，劑量計數器顯示 0，表示吸入器已經空了。



杏永醫院藥物諮詢專線：(07) 724-8999 轉分機 5110