

止膿敏點眼液

SINOMIN ophthalmic solution

(Sulfamethoxazole 40mg)



- 醫師為何開立此藥：

結膜炎、砂眼、流行性角膜炎、眼瞼炎、眼瞼緣炎、麥粒腫、淚囊炎、虹彩炎。

- 什麼時候該使用此藥：

眼睛發炎時，依醫師指示，一日數次，一次數滴。

- 使用方法：

1. 點藥前請先清潔雙手。
2. 點藥時避免瓶口接觸睫毛或眼球，避免汙染藥水。
3. 請輕輕拉開下眼瞼滴入眼藥水，閉眼按壓內眼角，

休息1分鐘以利吸收。



- **保存方式：**

密蓋，室溫(15~30℃)儲存，避免陽光直接照射。

建議於開封後28天內使用完畢，若未使用完請丟棄，避免汙染；如發生變質或過期，則不可再使用。

- **注意事項：**

1. 止膿敏點眼液屬於磺胺類抗生素眼藥水，對磺胺藥過敏者、蠱豆症患者須謹慎使用。
2. 治療期間應暫停配戴隱形眼鏡。若需配戴，建議使用眼藥水後間隔至少15~30分鐘再戴上隱形眼鏡。
3. 同時使用兩種以上之眼藥，請先用藥水再用藥膏，並間隔5分鐘。
4. 若出現刺激感、眼瞼緣紅腫、結膜充血等症狀，應立即停藥。

杏永醫院藥物諮詢專線：(07) 724-8999轉分機5110