

適倍樂舒沛噴吸入劑

Spiolto Respimat inhalation solution

(Tiotropium/Olodaterol 2.5/2.5mcg/puff/bot)



- **醫師為何開立此藥：**

適倍樂舒沛噴吸入劑適用於慢性阻塞性肺疾
(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)之長期維持治療。

- **藥物作用：**

本品是由兩種長效型支氣管擴張劑所組成的複方藥。

Tiotropium：長效型抗膽鹼藥物(LAMA)

Olodaterol：長效型 β_2 -腎上腺素受體促效劑(LABA)

- **注意事項：**

1. Spiolto Respimat 不可用於氣喘患者。
2. Spiolto Respimat 不適用於急性支氣管痙攣治療。
3. 狹角性青光眼、攝護腺肥大或膀胱頸阻塞的病人應小心使用 Spiolto Respimat。
4. 若發生反常性支氣管痙攣、應立即停用本藥。
5. 應小心避免讓噴霧進入眼睛，若發生眼睛疼痛、視線模糊、結膜炎等症狀，應立即停用本藥。

6. 本產品在藥罐插放入吸入器之後，僅能使用 3 個月，請室溫存放(15~30°C)。

● 使用方法：

(1) 放入藥罐 在第一次使用前，請務必執行以下步驟			
			
1. 在蓋子蓋緊時，按壓住安全扣並拔下透明底座。 2. 自藥盒取出藥罐。將藥罐推進吸入器，直到發出「卡嗒」聲。將藥罐頂向一堅固表面，以確保藥罐已完全裝入吸入器，請留意藥罐一旦插入吸入器後，不可再取出。 3. 裝回透明底座，並請勿再將透明底座取下。			
(2) 初次使用吸入器的準備步驟			
4. 吸入器朝上握好，蓋子蓋緊。將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲(約轉半圈)。 5. 打開蓋子直到「啪嗒」地完全打開。 6. 將吸入器朝向地面，按壓給藥按鈕。			
7. <u>重覆步驟 4、5、6，直到出現霧狀藥液後，再重覆步驟 4、5、6 三次，以確保吸入器已備妥可供使用。</u>			
(1) <u>若你的吸入器已超過 7 天未使用，請重覆步驟 4、5、6 一次。</u> (2) <u>若你的吸入器已超過 21 天未使用，請重覆步驟 4、5、6、7。</u>			
(3) 每日使用步驟 (一天僅可使用一次，每次使用須噴兩次。)			
	8. 吸入器朝上握好，蓋子蓋緊，以避免藥液意外釋出。 9. 將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲(約轉半圈)後，打開蓋子直到「啪嗒」地完全打開。 10. 慢慢將肺中空氣完全呼出，緊閉雙唇含住口含器末端，但勿遮住通氣孔。 11. 將吸入器指向喉嚨深處，用口<u>慢慢地深吸氣</u>時，按壓給藥按鈕，然後盡可能地繼續<u>緩慢吸氣，然後屏氣 10 秒鐘</u>或盡可能地延長屏氣。 12. 休息 30 秒後，重複步驟 9、10、11，讓自己吸入第二噴的劑量。 13. 保持蓋子緊閉，直到下次再使用吸入器。		
			

杏永醫院藥物諮詢專線：(07) 724-8999 轉分機 5110