

泛得林定量噴霧劑

Ventolin Inhaler

(Salbutamol 100 mcg/puff, 200 puff/bot)



- **醫師為何開立此藥：**

治療與預防支氣管痙攣，緩解氣喘發作時的症狀。

- **藥物作用：**

Salbutamol 為選擇性 β_2 交感神經受體作用劑，可迅速(5 分鐘內)產生短效性(4 小時)的支氣管擴張作用。


- **注意事項：**

1. 需要時每次 1~2 個劑量，一天最多 8 個劑量。
2. 若使用頻率增加，病情可能有惡化，建議就醫。
3. 共 200 個劑量，無劑量計數器，需記錄按壓次數。
4. 藥品罐為加壓器，不可強力打開或暴露於高溫。
5. 每週清潔吸入器：從塑膠外殼取出金屬罐，除去吸口蓋，以溫水清洗塑膠外殼(金屬罐請勿水洗)，放置過夜，徹底乾燥，再裝回金屬罐及吸口蓋。

- **交互作用：**

不可與非選擇性 β 阻斷劑(Propranolol)同時使用。

● 使用方法：

1.首次使用或 5 天以上未用，使用前需先移除蓋子，充分振搖，對空試噴兩下	2.檢查吸入器內外是否乾淨，充分振搖，確保吸口無鬆動，內容物混合均勻
	
3.食指放在藥罐上，拇指放在吸口的下方，深呼氣	4.將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬著吸口
	
5.深吸氣同時用食指下壓藥罐釋放噴霧，保持吸氣	6.移除吸入器閉氣 5~10 秒再恢復呼吸。若醫師指示需吸入第二劑，請間隔 30 秒，使用完畢再蓋回蓋子
	